



ТОВ «Міжнародний центр реабілітації та нейрофізіології»

04128, м. Київ, вул. Щербаківського Данила, 57Г
ЄДРПОУ: 44882108; тел.: +380993448319

01/08/2022 р.

Дитина **Прилипко Гліб Вадимович**, 15.07.2015 р.н., 7р

Консультувана дитячим неврологом он-лайн 01.08.2022 р. з дозволу батьків

Скарги: на затримку розвитку

З анамнезу: Дитина від 4 вагітності, пологи 3. Син 1998 р.н., здоровий, донька 2006 р.н., здорова. Данна вагітність перебігала без особливостей. Пологи в 41 тиж, коротка пуповина, пре еклампсія, асфіксія плоду, проколловання плідного міхура. М тіла 3600 гр, ріст 52 см, Апгар 4-6 б. Стан важкий. Лікування в відділенні інтенсивної терапії 1,5 місяці. ШВЛ 2 тиж. ЛШО 11.09.2014 р. МРТ гол.м.: ПВЛ. Проводився підбір АЕП: кеппра, фінлепсін, оксапін. Динаміка: перестав стояти ,03.2022 приступи збільшилися(призначено кеппра+оксапін). З'явилося більше емоцій.


В неврологічному статусі: ЧМН – ОГ 44 см (норма від 49 см), вторинна мікроцефалія, астигматизм, ЧАДЗН, збіжна альтернуюча косоокість, псевдобульбарний синдром. Спастичний тетрапарез, клонуси. Голову тримає, перевертається, сідає при підтримці, сидить з округлою спиною; не встає, не стоїть. Постава кіфосколіотична. Хода самостійна відсутня, пасивні крокові рухи з перехрестом на рівні нижньої третини гомілки. Згинально-пронаторні контрактири в ліктьових суглобах, соха valga sinistra, еківно-полско-вальгусні контрактири стоп. Функціональне укорочення лівої ноги на 1,5 см. Руками користується, предмети захвачує, захват долонний, не маніпулює. Інструкції виконує нижче віку. Мова на рівні окремих слів, дизартрія. Диференціє свій-чужий. Навички охайності сформовані. Вторинно-генералізовані приступи.

Діагноз МКХ-10: G 80.0. F71. G 40. GMFCS-IV. MACS-III. ДЦП, спастичний тетрапарез, розумова відсталість помірного ступеню, недорозвинення мовлення, дизартрія. Симптоматична епілепсія у вигляді вторинно-генералізованих медикаментозно резистентних приступів.

Рекомендовано:

- Спостереження дитячого невролога, ортопеда, офтальмолога, психіатра
- Продовжити прийом АЕП: Кеппра 26 мг/кг/добу, Осполот 50 по 1,5 табл 2 рази в день (31,6 мг/кг/добу) постійно
- Сирдалуд 0,2 по ½ табл. 2 рази на день тривало
- Контроль ЕЕГ
- Голкорексфлексотерапія
- Оксигенотерапія
- Масааж, ЛФК
- Консультація нейрофізіолога
- Логопедична корекція, логопедичний масаж
- Корекційний педагог
- Повторний огляд невролога після курсу реабілітації

Невролог дитячий,
лікар функціональної діагностики



Козубенко О.Г.